

Ranigast[®] SOS

wyrób medyczny

Tabletki do ssania

- ZMNIĘDZA DOŁĘGLIWOŚĆ ZWIĄZANE Z REFLUKSEM ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWYM (takie jak zgaga i ból w nadbrzuszu)
- ŁAGODZI NADKWAŚNOŚĆ
- CHRONI ŚLIZÓWKĘ ŻOŁĄDKA

1. Identyfikacja, skład i przeznaczenie

Ranigast S-O-S jest wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego takich jak: zgaga oraz ból w nadbrzuszu.

Ranigast S-O-S umożliwia wyrównanie kwasoty soku żołądkowego, zapobiegając wystąpieniu uczucia pieczenia, bólu w nadbrzuszu i niestrawności.

Ranigast S-O-S jest skuteczny niezależnie od zasadniczej przyczyny problemu. Ponadto można stosować go wspomagająco u pacjentów z zapaleniem żołądka.

1.1 Mechanizm działania

Ranigast S-O-S zawiera połączenie kilku substancji działających synergicznie w środowisku żołądka. Szczególny skład preparatu zawierającego: alginian sodu, kwas alginowy oraz wodorowęglan umożliwia jego szybkie działanie.

Alginy to polisacharydy uzyskiwane z niektórych gatunków alg morskich. Występują w postaci włókien, które w reakcji z kwaśnym środowiskiem żołądka, szybko ulegają żelifikacji. Powstały żel tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej żołądka. Połączenie wodorowęglanu i węglanu neutralizuje kwasotę soku żołądkowego. Ponadto pecherzyki dwutlenku węgla, które powstają w wyniku reakcji z kwasem solnym zostają uwieszone w żelu alginianowym. Przekształca się on w piankę unoszącą się na powierzchni soku żołądkowego i tworzącą barierę, która zmniejsza liczbę epizodów refluksu.

1.2 Skład

Każda tabletki zawiera: alginian sodu 200 mg, kwas alginowy 50 mg, wodorowęglan sodu 80 mg, węglan wapnia 140 mg.

Substancje pomocnicze

mannitol, sukraloza, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, aromaty: wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z imbiru, cytryna, mięta.

2. Opakowanie

Jedno opakowanie zawiera 12 lub 24 tabletki.

3. Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zaleca się przyjmować 2 tabletki po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.

Dzieci (6-12 lat): zaleca się przyjmować 1 tabletkę po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.

Dawki te skutecznie zmniejszają kwasotę soku żołądkowego i zapobiegają refluksowi żołądkowo-przełykowemu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

4. Działania niepożądane

Skład wyrobu medycznego Ranigast S-O-S jest bezpieczny, w pełni biogodny i dobrze tolerowany, co potwierdzono w badaniach preparatu.

Po zastosowaniu dawek niezbędnych do osiągnięcia efektu terapeutycznego jedynymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zaparcie i przemijająca biegunka.

Jeśli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

5. Interakcje z suplementami diety i lekami

Nie są znane interakcje wyrobu medycznego Ranigast S-O-S z suplementami diety. Jednakże obowiązuje ogólna zasada, że wszystkie suplementy diety, w tym witaminy, składniki odżywcze, preparaty ziołowe i homeopatyczne, należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed lub po przyjęciu wyrobu medycznego Ranigast S-O-S.

5.1 Interakcje z lekami

W związku z właściwościami fizykochemicznymi produktu Ranigast S-O-S może

on opóźnić lub ograniczać wchłanianie innych jednocześnie podawanych substancji i leków. W związku z tym przed rozpoczęciem stosowania takiego produktu jak Ranigast S-O-S należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli pacjentka stosuje leki antykoncepcyjne.

Przyjmowanie produktu Ranigast S-O-S może nie stanowić przeciwwskazania do równoczesnego stosowania produktów leczniczych, zawierających substancje aktywne takie jak: omeprazol, cymetydyna lub cizapryd; w takich przypadkach należy jednak skonsultować się z lekarzem.

6. Przechowywanie

Ranigast S-O-S należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wyrób medyczny zasadniczo przeznaczony jest do stosowania u dorosłych po ukończeniu 18 roku życia. Ranigast S-O-S może być okazjonalnie stosowany u młodzieży lub dzieci od 6 lat, przy czym u dzieci w wieku od 6 do 12 lat dawkę należy zmniejszyć o połowę i stosować produkt zgodnie z zaleceniami. W razie wątpliwości zalecana jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą.

Wyrób medyczny może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Nie przekraczać zalecanej dawki, ponieważ większe ilości mogą doprowadzić do zaparcia lub przemijającej biegunki.

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek lub przewlekłej niewydolności serca.

Produkt nie powinien być stosowany nieprzerwanie dłużej niż przez 30 dni. W przypadku potrzeby dłuższego stosowania zaleca się konsultację z lekarzem.

Jeśli po pewnym okresie stosowania produktu nie doprowadzi do wyraźnego złagodzenia objawów, zaleca się konsultację z lekarzem.

Każda tabletki jest przeznaczona do jednorazowego użycia. Tabletkę należy wyjąć z blistra bezpośrednio przed użyciem.

Nie przyjmować w przypadku nietolerancji lub zdiagnozowanej nadwrażliwości na składniki produktu.

8. Termin ważności

Nie przyjmować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Termin ważności obowiązuje pod warunkiem przechowywania produktu w nienaruszonym opakowaniu.

9. Utylizacja

Z wyrobem, którego termin ważności upłynął, należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu ani jego opakowania do środowiska.

SIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
WŁOCHY



Dystrybutor:



Z.F. Polpharma S.A.
Ul. Półpińska 19
83-200 Starogard Gdański
Polska

Data ostatniej aktualizacji: 10 2019

ULT-004500_1

ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:										
Material/ Material:										
Wzór/Artwork:	ULT-004500_1				Uwagi/ Comments:	Nazwa/Name: ---- Tekst/ Text: ----				
Preparat/Product:	RANIGAST SOS									
Rozmiar ulotki/ Leaflet size:	-	Kolorystyka/ Colours:	■ P 280 C		Gramatura/ Weight:	XXX	Farmakod/ Pharmacode:	XXX	Data	04.11.2019 A. Jankowski